



KUKORICA ÉS NAPRAFORGÓ VETŐMAGAJÁNLAT 2021



20 ÉVE ÖNNÖKKEL, ÖNÖKÉRT!

AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN NAGY VÁLTOZÁSON, FEJLŐDÉSEN MENT KERESZTÜL A HAZAI AGRÁRIUM, ÍGY VÁLTOZTUNK ÉS FEJLŐDTÜNK MI IS, BENNE LÉVŐ SZEREPLŐK.

A LIMAGRAIN MINŐSÉG AZONBAN EBBEN A VÁLTOZÓ KÖRNYEZETBEN IS ÁLLANDÓ MARADT!

BÜSZKÉK VAGYUNK ARRA, HOGY A 20 ÉV ALATT TÖBB 1000 TERMELŐ HASZNÁLTA ÉS HASZNÁLJA A PIACI IGÉNYEKNEK MEGFELELŐ VETŐMAGJAINKAT, KÖZÜLÜK SOKAN A KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG.

HISZÜNK A KÖZVETLEN KAPCSOLATOK HASZNOSSÁGÁBAN, A CÉLOK ÉS TAPASZTALATOK MEGOSZTÁSÁBAN, EZÉRT JÓL FELKÉSZÜLT SZAKEMBEREKBŐL ÁLLÓ KERESKEDELMI CSAPATUNK MINDIG KÉSZ SEGÍTENI ÖNÖKET.

TOVÁBBRA IS AZON DOLGOZUNK, A PARCELLÁKON, A LABORATÓRIUMAINKBAN ÉS ÜZEMEINKBEN, HOGY A KIHÍVÁSOKNAK ELEGET TÉVE, INNOVATÍV MEGOLDÁSAINKKAL, SZEMÉLYRE SZABOTT AJÁNLÁSAINKKAL AZ ÖNÖK MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSÁT MÉG SIKERESEBBÉ TEGYÜK!

KÖSZÖNJÜK! LIMAGRAIN MAGYARORSZÁG





FRISS FUVALLAT



LAPOZZON TOVÁBB!



SZEMBETÜNŐ MINŐSÉG



LG 31.330 Dorado

www.lgseeds.hu



LG 31.330

SZEMES FAO 330-340

ÚJ!

HYDRANEO[®]
Technológia asszilykezeléshez




Kiváló termőképességű hibrid aransárga szemekkel a korai éréscsoport első felében. Termésstabilitását, az eltérő körülmények között is kiváló csővég termékenyülésének és jól telítődő szemeinek köszönheti.

- KIVÁLÓ SZEMMINŐSÉG,
- NAGY HEKTOLITER TÖMEG,
- NAGYON JÓ SZÁRAZSÁGTŰRÉS,
- NAGYON JÓ ÉVJÁRAT ÉS TERMŐHELY STABILITÁS,
- KIVÁLÓ CSŐ- ÉS SZÁREGÉSZSÉG


AZOKNAK AJÁNLJUK, AKIK

- nagy termőképességű hibridet keresnek a korai éréscsoport elejéről, amely szárazságban is stabil,
- alapvetően korán szeretnek betakarítani, de ha hosszabb ideig kint marad a kukorica, az sem okoz termés-csökkenést, illetve minőségromlást

Termésstabilitás a korai csoport közepére jellemző terméssel és a csoport elejére jellemző vízzel!



(Készült: Limagrain Európai fejlesztési kísérletek, 2019., eredményei alapján. Termés: 14% nedvességre számolva.)



(Készült: Limagrain Európai fejlesztési kísérletek, 2018., eredményei alapján. Termés: 14% nedvességre számolva.)



ZÁRT ALAKZATBAN



LG 31.390 Phalanx

www.lgseeds.hu



LG 31.390

SZEMES FAO 380-390

ÚJ!

HYDRANEO[®]
Technológia aszálykezeléshez




Hosszúkas szemek, szorosan egymás mellett. A minden helyzetben zárt szemsorok kiválóan kitöltik a rendelkezésre álló teret a vékony csutkán, ezzel biztosítva hatékony tápanyag beépülést és a hibrid termésszabilyosságát.

- **NAGY TERMŐKÉPESSÉG**
- **NAGYON JÓ SZÁRAZSÁGTŰRÉS**
- **NAGYON JÓ KEZDETI FEJLŐDÉS**
- **GYORS VÍZLEADÁS**


JÓ VÁLASZTÁS AZOKNAK, AKIK

- a szárazság hatásának csökkentését a jó agrotechnikai gyakorlat és a hibrid választás kombinációjával oldják meg,
- olyan hibridet keresnek, amely meghalja a kedvező termőhelyi adottságokat,
- ugyanakkor jól képes kompenzálni, ha a körülmények kedvezőtlenebbre fordulnak

Termésszabilyosság változó klimatikus körülmények között!



(Készült: Limagrain Európai fejlesztési kísérletek, 2019., eredményei alapján. Termés: 14% nedvességre számolva.)



(Készült: Limagrain Európai fejlesztési kísérletek, 2018., eredményei alapján. Termés: 14% nedvességre számolva.)



ÁTTÖRÉS

LG 31.415 (Invador)

www.lgseeds.hu


LG 31.415 (Invador) ÚJ!
SZEMES FAO 420-430

HYDRANEO
Technológia aszálykezeléshez




A termőképesség és a szárazságtűrés optimális kombinációjával igazi áttörést jelent a középérésű csoport elején. Tulajdonságai lehetővé teszik, hogy az ország szinte mindegyik régiójában szerepet kapjon a vetésszerkezetben.

- KIVÁLÓ TERMŐKÉPESSÉG,
- JÓ SZÁRAZSÁGTŰRÉS,
- NAGYON JÓ KEZDETI FEJLŐDÉS,
- NAGYON JÓ CSŐ- ÉS SZÁREGÉSZSÉG,
- JÓ VÍZLEADÁS


MINDENKINEK AJÁNJUK, AKI

- jó, vagy átlagos termőhelyi adottságok között gazdálkodik és a nagy termés elérése mellett a termésbiztonság is fontos számára,
- területein az elérhető termésszintet kis vagy közepes mértékben befolyásolja az évszám,
- a vetés korai kezdéséhez keres arra alkalmas, középérésű hibridet

Termés és szemnedvessége előnyben a versenytársakhoz képest, eltérő körülmények között is!



(Készült: Limagrain Európai fejlesztési kísérletek, 2019., öntözött helyek alapján. Termés: 14% nedvességre számolva.)



(Készült: Limagrain Európai fejlesztési kísérletek, 2019., nem öntözött helyek alapján. Termés: 14% nedvességre számolva.)



EGYENESEN TÖKÉLETES



LG 31.455 (Lineade)

www.lgseeds.hu



LG 31.455 (Lineade) ÚJ!
SZEMES FAO 450-460

HYDRANEO
Technológia aszálykezeléshez




Jó adottságú termőhelyek kiemelkedő termőképességű hibridje.
Szabályos, hosszú, hengeres csövei az alapjuktól a végükig azonos átmérőjűek. Ez a tökéletesen egyenes csőtípus nagy terméspotenciált hordoz magában.

- KIEMELKEDŐ TERMŐKÉPESSÉG,
- JÓ SZÁRAZSÁGTŰRÉS,
- JÓ TERMŐHELY STABILITÁS,
- KIVÁLÓ CSŐ- ÉS SZÁREGÉSZSÉG

AZOKNAK AJÁNLJUK, AKIK

- a jó termőhelyi adottságú területeik terméspotenciáljának maximális kihasználására törekszenek,
- biztosítják a hibrid termésképzéséhez szükséges agronómiai feltételeket és ezért kiemelkedő termést várnak el

Terméselőny intenzív és fél-intenzív termesztési körülmények között is!



(Készült: Limagrain Európai fejlesztési kísérletek, 2019., öntözött helyek alapján. Termés: 14% nedvességre számolva.)

(Készült: Limagrain Európai fejlesztési kísérletek, 2019., nem öntözött helyek alapján. Termés: 14% nedvességre számolva.)

LG 31.322

SZEMES FAO 320-330

HYDRANEO[®]
Technológia aszálykezeléshez



Jó termésstabilitással és szárazságtűréssel rendelkező korai hibrid. Olyan területekre ajánljuk, ahol a növényeknek rövid idő áll rendelkezésre a szemtelítődésre. Akár az augusztusi hőstressz, vagy a talajban elérhető vízkészlet hiánya okozza a rövidebb szemtelítődési időt, az LG 31.322 jól tűri az ilyen kitettséget.

- **NAGYON JÓ TERMŐKÉPESSÉG,**
- **JÓ TERMÉSSTABILITÁS,**
- **NAGYON JÓ SZÁRAZSÁGTŰRÉS,**
- **NAGYON JÓ CSŐ EGÉSZSÉG**

ÖNNEK AJÁNLIJUK:

- Ha rövid tenyészidejű, jó alkalmazkodóképességű hibridre van szüksége.
- Ugyanakkor, kedvező körülmények esetén nem akar lemondani a nagyobb termés lehetőségéről sem.

LG 31.377

SZEMES FAO 350-370

HYDRANEO[®]
Technológia aszálykezeléshez



Az elsőként bevezetett HYDRANEO hibridünk, mely azoknak jelent megoldást, akik a szárazság kockázatának csökkentése érdekében az agrotechnikai megoldások mellett a hibridválasztásra is hangsúlyt fektetnek.

- **NAGYON JÓ TERMŐKÉPESSÉG,**
- **JÓ TERMÉSSTABILITÁS,**
- **JÓ SZÁRAZSÁGTŰRÉS,**
- **EGÉSZSÉGES, SZILÁRD SZÁR**



Szabó Tamás
Értékesítési képviselő
Tolna-megye

„Ajánlom azoknak, akik jó, vagy átlagos termőhelyi adottságok között gazdálkodnak és az elérhető termésszintet kis vagy közepes mértékben befolyásolja az évjárat. Azoknak is jó választás, akik a szárítási költségek csökkentése érdekében alacsony szemnedvességgel végzik a betakarítást, ezért egészséges, erős szárú hibridre van szükségük.”

LG 31.388

SZEMES FAO 370-380

HYDRANEO[®]
Technológia aszálykezeléshez



Az a típusú HYDRANEO hibrid, melynek termésstabilitása ugyan kisebb szárazság stressz esetén is érzékelhető, de igazi előnye akkor mutatkozik meg, amikor erősebb a szárazság mértéke. Kompakt csövei még ilyenkor is szabályosan, végig termékenyülnek.

- **KIVÁLÓ TERMÉSSTABILITÁS,**
- **KIVÁLÓ SZÁRAZSÁGTŰRÉS,**
- **NAGYON JÓ CSŐEGÉSZSÉG,**
- **NAGY HEKTOLITER TÖMEG**

ÖNNEK AJÁNLIJUK:

- ha átlagos vagy gyengébb termőhelyi adottságok mellett is jó termést akar elérni,
- gyakran előfordul szárazság, ezért a termésbiztonság évjáratától függetlenül az egyik legfontosabb szempont,
- ha szeretné kihasználni a korai vetés előnyét is.

LG 30.500

SZEMES FAO 480-490

HYDRANEO[®]
Technológia aszálykezeléshez



Nagyon jó termőképességű hibrid a középérésű csoport végén. Takarmányozási célra nedvesen roppantva is biztonságosan felhasználható. Jól viseli a stresszhatásokat, azonban termőképességének kihasználása akkor lehetséges, ha biztosítják a fejlődéséhez és a termésépzéshez szükséges optimális agronómiai feltételeket.

- **NAGYON JÓ TERMŐKÉPESSÉG,**
- **JÓ STRESSZTŰRÉS,**
- **KIVÁLÓ CSŐEGÉSZSÉG,**
- **KIVÁLÓ SZÁRSZILÁRDSÁG**



Vogl Attila
Értékesítési képviselő
Baranya-megye

„Azoknak ajánlom, akik szeretnék kihasználni a hosszabb tenyészidőben rejlő nagyobb termés potenciál lehetőségét. Kedvező termőhelyi adottságokkal rendelkező területen, még ha kisebb mértékű szárazság előfordul is, hozza az elvárt termést.”

LG 32.58

SZEMES FAO 240-260



Kínálatunk évek óta kedvelt igen korai érésű hibridje. Szemtípusa flint/dent (simaszemű/lófogú), szemes és siló hasznosításra is alkalmas. Termőképessége éréscsoportjában jó, vízleadása átlagos.

- GYORS KEZDETI FEJLŐDÉS,
- JÓ ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG,
- JÓ SZÁRAZSÁGTŰRÉS,
- STABIL, SZILÁRD SZÁR

AZOKNAK AJÁNLIJUK, AKIK

- megkésett vetéshez, illetve
- korán lekerülő elővetemény után másodvetésre alkalmas hibridet keresnek

LG 30.315

SZEMES FAO 320-330



Nagyon jó termőképességű, igazán korai hibrid. Időben vetve jó eséllyel kerül el a termékenyülés időszakában előforduló szárazságot még az ország déli régióiban is. Mivel korán beérik, érdemes azonnal betakarítani, így utána kellő időben, jó magágyat lehet készíteni az őszi búza számára.

- GYORS KEZDETI FEJLŐDÉS,
- KORAI VIRÁGZÁS,
- KORAI ÉRÉS,
- NAGYON JÓ TERMŐKÉPESSÉG

AZOKNAK JELENT MEGOLDÁST, AKIK

- átlagos, vagy kissé gyengébb adottságú területeikre korán aratható hibridet keresnek,
- a korai betakarítás előnyeit kihasználva nem akarnak lemondani a nagy termésről sem

LG 30.369 Limanova

SZEMES FAO 360-370



Több, eltérő évjárat üzemi tapasztalatai és elégedett partnereink eredményei igazolják kiváló termőképességét és termésbiztonságát. Stressztűrő képességét aszályos években, kiváló termőképességét kedvező évjáratokban bizonyította. A legnépszerűbb szemes kukoricánk!

- NAGYON JÓ TERMŐKÉPESSÉG,
- KIVÁLÓ TERMŐHELY ÉS
- ÉVJÁRAT STABILITÁS,
- KÖZÉPMAGAS SZÁR



Ofenbeck János
Értékesítési képviselő
Győr-Ménfőcsanak-megye

„Évek óta nagy kedvencem ez a hibrid! Az elmúlt években a jó földeken sorban átlag felett termett a partnereimnél és kedvezőtlen körülmények között sem hagyta cserben a termelőjét. Minden tulajdonsága meg van hozzá, hogy továbbra is bátran ajánljam.”

LG 30.389

SZEMES FAO 380-390



Nagyon jó termőképességű hibrid a korai éréscsoport végén. A kedvező adottságú területeken gazdálkodók hibridje, amely nem csak intenzív technológia alkalmazása esetén jó választás. Gyors vízleadásának köszönhetően a betakarításkori szemnedvessége az azonos érés idejű hibridekéhez alacsonyabb.

- KIVÁLÓ KEZDETI FEJLŐDÉS,
- NAGYON GYORS VÍZLEADÁS,
- NAGYON JÓ CSŐ EGÉSZSÉG

AJÁNLIJUK,

- átlagos illetve jobb adottságú területeken gazdálkodóknak,
- közepes vagy enyhe szárazság stressz esetén.



TÖBB TEJ, KEVESEBB ÖNKÖLTSÉG!



LGAN SILÓKUKORICÁK

www.lgseeds.hu


LG 31.558

ÚJ!

SILÓ FAO 550-560



Sikeres silókukorica programunk késői érésű hibridje. Tenézszeideje következtében kitolható a silózás időszaka, elkerülhető az optimális szárazanyag tartalomnál későbbi betakarítás. Így az intenzív tejelő állományoknak kiválóan emészthető tömegtakarmány előállítását teszi lehetővé. Agronómiai tulajdonságai és takarmány értéke alapján is alkalmas a régebbi LGAN hibridek leváltására.



- KIVÁLÓ ZÖLD- ÉS SZÁRAZANYAG TERMÉS,
- HASSÚ FELSZÁRADÁS,
- JÓ CSŐ EGÉSZSÉG,
- KIVÁLÓ EMÉSZTHETŐ ROST ARÁNY,
- NAGY ENERGIATARTALOM

PARTNEREINK, AKIK MÁR ÜZEMI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KIPRÓBÁLTÁK, EGYBEHANGZÓAN

- a nagy zöldtermését,
 - jó szárazságtűrését
 - és kiváló beltartalmi értékeit
- emelték ki a hibrid előnyeként.**

(Készült: A hibridet termelő partnereink véleményei alapján, 2019.)

Az LG 31.558 termés és takarmány minőségi előnyei egy régebbi LGAN hibridhez viszonyítva



(Limagrains termékfejlesztési kísérletek eredményei alapján, 2018., 7 hely átlaga.)



Ismert és kedvelt LGAN hibridünk, mert jól illeszthető a különböző technológiai igényekhez, jó alkalmazkodóképességű silókukorica. Tenyésztése lehetővé teszi az ország legnagyobb silókukorica termesztő régióiban való biztonságos termesztését.

- **NAGY TÖMEGŰ LEVÉLZET,**
- **JÓ CSŐARÁNY,**
- **KIVÁLÓAN EMÉSZTHETŐ,**
- **ENERGIA DÚS SZILÁZS KÉSZÍTÉSÉT TESZI LEHETŐVÉ**

AZOKNAK AJÁNLJUK, AKIK

- a silózás korai kezdéséhez,
- vagy gabona szenázs utáni vetéshez-keresnek minőségi siló hibridet



Az LG 31.479 hibridünk már a Milk+ értékelési rendszer segítségével került kiválasztásra. A teljes növény emészthetősége kedvező, így nagy energiatartalmú, kiválóan hasznosuló szilázs készítését teszi lehetővé.

- **NAGYON JÓ KEZDETI FEJLŐDÉS,**
- **NAGY TÖMEGŰ LEVÉLZET,**
- **NAGYON JÓ EMÉSZTHETŐSÉG,**
- **JÓ KEMÉNYÍTŐ ÉS ROST ARÁNY**



Mórocz Péter
Termékfejlesztési vezető

„Silókukorica hibridjeink értékelése és az újak kiválasztása már a Milk+ módszerrel történik. Ezekkel a hibridekkel tovább növelhető a hektáronként megtermelhető hasznos energia. Gazdaságosabb tömegtakarmány előállítását és többlet tejhozam elérését teszik lehetővé. Amellett, hogy javítható a tejtermelés eredményessége, a fogyasztók elégedettsége is garantált.”




Évek óta az egyik legnépszerűbb LGAN siló hibridünk. 2019-ben a legnagyobb területen vetett silókukorica Magyarországon! 
(Forrás: Kleffmann 2019.)

- **NAGY ZÖLDTERMÉS,**
- **NAGYON JÓ TERMÉSSZABILITÁS,**
- **JÓ CSŐEGÉSZSÉG,**
- **MAGAS EMÉSZTHETŐ ROST ARÁNY**
- **KIVÁLÓAN EMÉSZTHETŐ SZILÁZS**

A TEJTERMELŐ GAZDASÁGOKBAN VÉGZETT FELMÉRÉSEINK ALAPJÁN AZ LG 34.90-ET AZÉRT VÁLASZTJÁK, MERT:

- **tetszetős,**
- **jó zöldtermést ad,**
- **könnyen silózható,**
- **nagyon jó beltartalmú,**
- **stabil,**
- **száraz évben is lehet rá számítani.**

(Készült: A hibridet termelő partnereink véleményei alapján.)



Barócsi-Sári Hajnalka LG területi képviselő Heves, Nógrád, Jászág

Milk+ értékelési rendszerünk alapján, a hektáronként megtermelhető hasznos energia tartalma az egyik legnagyobb, a jelenlegi LGAN hibridek között. Legfőbb erénye a kiváló rost emészthetősége. Ebből eredően többlet energia hozamot biztosít a tejtermeléshez.

- **KIVÁLÓ KEZDETI FEJLŐDÉS,**
- **NAGY ZÖLD- ÉS SZÁRAZANYAG TERMÉS,**
- **JÓ CSŐARÁNY,**
- **ENERGIA DÚS,**
- **JÓL EMÉSZTHETŐ SZILÁZS**



Dobi Mihály
Értékesítési képviselő Hajdú-Bihar-megye

„A hibridet az elmúlt években már több, nagy tehenészet kipróbálta a megyében. Tapasztalataik igen jók voltak. Többen kiemelték, hogy a nagy zöld tömege mellett jó volt a csőaránya is. Homogén maradt a növény állomány szárazabb körülmények között is. Időben betakarítva, könnyen emészthető, jó szilázst tudtak készíteni belőle.”



BŐSÉG



LG 50.479 SX Tesoro

www.lgseeds.hu



LG 50.479 SX ÚJ!

KÖZÉP-KORAI, LINOLSAVAS (LO)




Kiváló termőképességű, linolsavas hibrid Express® gyomirtási technológiát igénylő területekre.

PARTNEREINK TÖBB, MINT 80%-A ELÉGEDETT A HIBRID IDEI TELJESÍTMÉNYÉVEL!


- Kiegyenlítetttségét,
- kedvező növénymagasságát,
- jó kórtani tulajdonságait,
- korai érés idejét,
- félig bókoló tányérállását tartják kimondottan előnyösnek.

(A hibridet 2020-ban üzemi körülmények között kipróbáló partnereink körében végzett felmérés alapján.)

Az LG 50.479 SX termőképessége és olajtartalma népszerű versenytársakkal összehasonlítva



Az LG 50.479 SX terméseredményei bemutató fajtakísérletekben, 2019., és 2020.






Kísérleti eredményei alapján kipróbálásra ajánljuk legújabb Express[®] toleráns magas olajsavas hibridünket.

- **JO TERMŐKÉPESSÉG A HO HIBRIDEK SZINTJÉN**
- **MAGAS ÉS STABIL OLAJSAV TARTALOM,**
- **SZÉLES SPEKTRUMÚ PERONOSPÓRA ÉS SZÁDOR REZISZTENCIA**

AZOKNAK AJÁNLIJUK:


- akik a magas olajsavas napraforgó termesztés biztonságát az Express[®] gyomirtási technológiára alapozzák,
- a terményértékesítés során az olajsav prémiumot is realizálni kívánják.

Az LG 50.779 HO SX olaj és azon belül olajsav tartalma is magas



(Limagrain termékefejlesztési kísérletek eredményei alapján.)

Az LG 50.779 HO SX terméseredményei bemutató fajtakísérletekben, 2020



(Nettó termés, 9% nedvességre számolva.)

EXPRESS[®] 50 SX[®]

Hatóanyag: 50% tribenuron-metil	Forg.kat.:I.	Eng.szám: 534/2006. NTKSZ	m.v.i.:0
Méhvészélyesség:	nem jelölésköteles		
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	kifejezetten veszélyes		
Tűzveszélyesség:	nem jelölésköteles		
p.o. LD50 patkányon:	>5000 mg/ttkg		
Kiszerezés:	112, 5 g-os műanyag flakon		

Kultúra	Károsító	Dózis (g/ha)	é.v.i.(nap)
kizárólag Express [®] -toleráns napraforgó	magról kelő kétszikű gyomnövények, valamint mezei acat	45 osztott kezelés: 22,5+22,5	nk.

Hatásmód és hatékonyság:

Az Express[®]-toleráns napraforgó hibridek genetikai toleranciája lehetővé teszi az Express[®] hatóanyagának lebontását a napraforgóban, mely a szelektivitás alapja. A gyomirtó szer főleg a leveleken keresztül hat. A szer az acetolaktát-szintetáz enzim működését gátolja. Az enzimműködés gátlása miatt az érzékeny növényekben a tápanyagszállítás, a légzés és az anyagcsere a kijuttatást követő néhány órán belül leáll. A gyomnövényeken látható tipikus tünetek a kezelés után 3-10 nappal válnak látóhatóvá.

Hatékonyság (95-100%) az Express[®]-toleráns napraforgó gyomirtásában:

KÁROSÍTÓ	HATÉKONYSÁG	KÁROSÍTÓ	HATÉKONYSÁG
Árvacsálán fajok	✓	Parlagfű (szik-2 leveles)	✓
Boglárka fajok	✓	Parlagi pipitér	✓
Bükköny	✓	Páztortáska	✓
Csattanó maszlag	✓	Perzsa veronika	✓
Disznóparéj fajok	✓	Pipacs	✓
Fekete ebszőlő	✓	Poloskafű	✓
Keszegsaláta	✓	Selyemmályva	✓
Libatop fajok	✓	Sebforrasztó zsombor	✓
Mezei acat	✓	Szerbtövis fajok	✓
Mezei árvácska	✓	Szikkfű fajok	✓
Mezei csibehúr	✓	Tarka kenderkefű	✓
Mezei tarsóka	✓	Vadrepce	✓
Mustár	✓	Zsázsa fajok	✓

A felhasználás előtt mindig olvassa el és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!

Felhasználási javaslatok:

Az Express[®] gyomirtó szert korai posztemergensen kell kijuttatni, amikor az Express[®]-toleráns napraforgó hibrid 2-6 leveles fejlődési állapotban van. Kijuttatáskor a gyomoknak már kikelt, maximum 4 leveles stádiumban kell lenniük. A legjobb gyomirtó hatás eléréséhez a kezelést akkor kell elvégezni, amikor a gyomok érzékeny, aktív növekedési fázisban vannak. A legtöbb gyom csírázaskor és fiatal (2-4 leveles) korban a legérzékenyebb. A mezei acat ellen annak tölevélrózsás állapotában kell védekezni. Az Express[®] 50 SX[®] gyomirtó szerre nincs utóvetemény korlátozás, a készítménnyel kezelt napraforgó betakarítása után ősszel repce és kalászos gabona is vethető.

Ha a kezelendő terület erősen fertőzött parlagfűvel (Ambrosia artemisiifolia), illetve a gyomok kelése vonatott, az Express[®] osztott kijuttatása javasolt. Az első kezelést a parlagfű kelése után, azok szik-, maximum 2-leveles korában kell elvégezni. A második kezelést a gyomok újrakelése után, azok szik-, maximum 2-leveles korában javasolt elvégezni. Az Express[®] dózisa osztott kezelés esetén 22,5 g/ha + Trend[®] 90 0,1%.



Egyszeri Express[®] kezelés hatására gyommentes az induló napraforgóállomány (Hódmezővásárhely, 2020.05.28.)

Az Express[®] és az SX[®] az FMC és leányvállalatainak bejegyzett márkanéve.



A HO CLP hibridek között termőképessége kiemelkedő, a népszerű magas olajsavas CL hibridekkel azonos szintű termés elérésére képes. Olaj- és olajsavtartalma a népszerű magas olajsavas hibridekét meghaladja. Termésbiztonságában nagy szerepet játszik jó betegség ellenállósága.

- **JÓ TERMŐKÉPESSÉG,**
- **TERMÉSTABILITÁS,**
- **MAGAS ÉS STABIL OLJASAV TARTALOM,**
- **SZÉLES SPEKTRUMÚ PERONOSZPÓRA ÉS**
- **SZÁDOR REZISZTENCIA**

AZOKNAK TUDUNK MEGOLDÁST NYÚJTANI,

- akik a magas olajsavas napraforgó termesztés biztonságát a Clearfield® Plus technológiára alapozzák,
- a termés értékesítés során az olajsav prémiumot is realizálni kívánják.



Kedvező agronómiai tulajdonságainak köszönhetően az ország mindegyik régiójában sikeresen termesztendő hibrid.

PARTNEREINK, AKIK MÁR TÖBB ÉVE TERMELIK, LEGINKÁBB

- **JÓ ALKALMAZKODÓKÉPESSÉGE,**
- **ÉS TERMÉSTABILITÁSA,**
- **MAGYON JÓ BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁGA,**
- **JÓ ÁLLÓKÉPESSÉGE MIATT VÁLASZTJÁK.**

AZOKNAK AJÁNLUK,

- akik az átlagos, vagy annál gyengébb adottságú területeikre is megbízható, jól teljesítő hibridet keresnek,
- tudatosan szolgálják ki a napraforgó igényeit és a technológiájukban a kémiai növényvédelem mellett fontos a hibrid betegség ellenállósága is.


CL ÉS CLP NAPRAFORGÓ GYOMIRTÁSI RENDSZER

A BASF technológiai ajánlata Clearfield® és Clearfield® Plus napraforgó hibridekhez


Clearfield® hibridekhez

A Clearfield® gyomirtási rendszer a hibridszortiment lecserelődésével csökkenő területen, de a következő években továbbra is a napraforgó-termesztők rendelkezésére fog állni. Technológiai ajánlatunk változatlanul a Clearfield® (IMISUN) hibridekre preemergensen 3,5 l/ha Wing®-P és posztemergensen a magról kelő kétszikű gyomnövények 2–4 leveles állapotában, egyszikűek esetén gyökérváltásig 1,2 l/ha dózisban kijuttatott Pulsar® 40 SL.

Technológiai ajánlatunk a napraforgóban a Clearfield® gyomirtási rendszer alkalmazásával



Technológiai ajánlatunk a napraforgóban a Clearfield® Plus gyomirtási rendszer alkalmazásával



Clearfield® Plus hibridekhez

A Clearfield® Plus hibridek a jelenleg elérhető legmodernebb nemesítési irányt képviselik, a Pulsar® Plus pedig igazi előrelépést jelent a gyomirtásban a Pulsar® 40 SL-hez képest.

Clearfield® Plus vagy CLP hibridek gyomirtására preemergensen 1 l/ha Spectrum®-ot, majd posztemergensen a magról kelő kétszikűek 2-4 leveles állapotában, egyszikűek esetében gyökérváltásig 2 l/ha Pulsar® Plus kijuttatását javasoljuk.

A Pulsar® 40 SL és Pulsar® Plus közötti egyik fő különbség a Pulsar® Plus parlagfű elleni nagyobb hatékonysága, plusz rugalmasságot biztosítva a kijuttatás időzítésében. A kezelés optimális időzítése a Pulsar® Plus esetében is a gyomok 2–4 leveles állapota. A gyom-növények kedvező időjárási körülmények között akár 3-4 nap alatt képesek egy újabb levélemeletet fejleszteni, tehát akár 3 nap is elegendő lehet ahhoz, hogy kicsússzunk az optimális időzítésből. Ha tőlünk független okok miatt megcsúszunk a kezelés időzítésével, a Pulsar® Plus – szemben a Pulsar® 40 SL-lel – ezekben a helyzetekben is biztosabb megoldást ad. A 6–8 leveles parlagfűvek csúcsajtása elhal, oldalhajtásokat kisebb arányban képes fejleszteni.

BASF
We create chemistry

Clearfield® Plus
Gyomirtási Rendszer Napraforgóban

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót! A Pulsar® 40 SL és a Pulsar® Plus I-es forgalmazási kategóriás termék. A Pictor®, a Spectrum® és a Wing®-P II-es forgalmazási kategóriás termék. A Rafting® III-as forgalmazási kategóriás termék.



Nagyon jó termőképességű HO hibrid, amely az átlagos vagy gyengébb adottságú termőhelyeken is eredményesen termesztethető. Kiemelkedően magas és stabil olajsav tartalom jellemzi. Kedvező kórtani tulajdonságai miatt bio termesztést folytató partnereink is nagyon kedvelik.

- **MAGAS ÉS STABIL OLAJSAVTARTALOM,**
- **JÓ ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG,**
- **ERŐS, KÖZÉPMAGAS SZÁR,**
- **KIVÁLÓ BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG,**
- **SZÉLES SPEKTRUMÚ PERONOSZPÓRA ÉS SZÁDOR REZISZTENCIA**

AZOKNAK AJÁNLIJUK,

- akik termőhelytől és évjáratoktól függetlenül stabilan teljesítő HO hibridet keresnek,
- a termés értékesítés során az olajsav prémiumot is realizálni kívánják.



Nagyon jó termőképességű és termésstabilitású hibrid. Alkalmazkodóképessége és szárazságtűrése jó. A leggyakrabban előforduló szár és tányér betegségekkel szemben jó ellenállósággal rendelkezik. Korai érése miatt deszikkálás nélkül is időben betakarítható.

- **NAGYON JÓ ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG,**
- **JÓ BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG,**
- **KORAI ÉRÉS,**
- **MAGAS OLAJTARTALOM**

AZOKNAK AJÁNLIJUK,

- akik a nem gyomirtó szer rezisztens hibridek termelését részesítik előnyben,
- az agrotechnikai, illetve kémiai növényvédelem mellett fontos a hibrid ellenállóképessége is,
- deszikkálás nélkül kívánják megoldani a betakarítást.

GENETIKAI VÉDELEM A TERMÉSBIZTONSÁGÉRT

PERONOSZPÓRA REZISZTENCIA



A napraforgó peronoszpóra kórokozója (*Plasmopara halstedii*) világszerte elterjedt. A képen a betegség legjellegzetesebb tünete, a fogékony növények törpülése látható.

A kórokozónak ez idáig több, mint 40 patotípusát azonosították különböző országokban. Ezek közül az alábbi 7 előfordulását igazolták Magyarországon: 100; 330; 700; 704; 710; 714; 730.

A legnagyobb veszélyt a kórokozó nagyfokú változatossága és mutációs képessége jelenti, aminek következtében a jelenleg általánosan használt hatóanyagú vetőmag csávázás, önmagában már nem jelent elegendő védelmet.

- A Limagrain folyamatosan nyomon követi az ismert peronoszpóra rasszok elterjedését és figyeli az újak megjelenését,
- feltérképezi a genetikai forrásokat új rezisztencia gének után kutatva.
- A nemesítés során a hibridekbe több rezisztencia gén kombinációját építi be,
- teszteli ezek hatékonyságát laboratóriumi és szántóföldi körülmények között.
- A legújabb LG napraforgó hibridek olyan rassz-specifikus rezisztencia gén kombinációkkal rendelkeznek, amelyek biztos védelmet nyújtanak mind a 7, Magyarországon előforduló peronoszpóra patotípussal szemben.

A napraforgó peronoszpóra elleni védekezés elemei

Agrotechnikai védekezés:

- legalább négyéves vetésforgó betartása,
- a kórokozó fennmaradását biztosító növények – parlagfű, szerbtövis, napraforgó árvakelés – irtása,
- az optimálisnál korábbi vetés elkerülése,
- harmonikus tápanyag ellátás

Genetikai védelem:

- a Magyarországon előforduló patotípusok mindegyikével szemben rezisztens hibridek vetése

Kémiai védekezés:

- Vetőmag csávázás, ha a hibrid nem rendelkezik kellő mértékű rezisztenciával
- A betegség elsődleges fertőzésével szemben az állomány kezelés hatástalan.

- **A genetikai védelem a leghatékonyabb megoldás a peronoszpóra termést csökkentő hatásával szemben.**

- Legnagyobb előnye, hogy – a csávázással ellentétben - az időjárási körülményektől függetlenül, az egész tenyészidőszak folyamán védelmet jelent.

- A rezisztencia gének nem csak a primer, de a szekunder fertőzéssel szemben is védenek.

- A peronoszpóra rezisztens hibridek használatával csökken az esély arra, hogy a kórokozónak további, fungicid-rezisztens patotípusai alakuljanak ki.

 SZEMES KUKORICA ÖSSZEFOGLALÓ

	LG 32.58	LG 30.315	LG 31.322	LG 31.330	LG 31.377	LG 30.369	LG 31.388
HIBRID JELLEMZŐK				ÚJ!			
Kezdeti fejlődési erély	nagyon jó	nagyon jó	nagyon jó	jó	kiváló	átlagos	kiváló
Virágzási idő az éréscsoporton belül	korai	korai	korai	korai	késői	átlagos	közép-korai
Érésidő	igen-korai	korai	korai	korai	korai	közép-korai	közép-korai
Vízleadás	átlagos	nagyon gyors	gyors	gyors	gyors	gyors	átlagos
FAO szám	260-240	320-330	320-330	330-340	350-370	360-370	370-380
Termőképesség az éréscsoportjában	nagyon jó	nagyon jó	jó	kiváló	nagyon jó	nagyon jó	jó
Termés stabilitás	nagyon jó	nagyon jó	nagyon jó	nagyon jó	jó	nagyon jó	kiváló
Cső hosszúság / átmérő	közepes/ közepes	közepes/ közepes	közepes/ közepes	közepes/ közepes	hosszú/ közepes	hosszú/ közepes	közepes/ vastag
Szemsorok száma	14 - 16	16	16	16 - 18	16 - 18	16 - 18	18
Hektoliter tömeg	jó	átlagos	nagyon jó	kiváló	nagyon jó	nagyon jó	kiváló
Szárazság tűrés	jó	jó	nagyon jó	nagyon jó	nagyon jó	jó	kiváló
HYDRANEO	-	igen	igen	igen	igen	-	igen
Cső egészség	jó	jó	nagyon jó	nagyon jó	kiváló	nagyon jó	kiváló
Szár szilárdság	nagyon jó	jó	nagyon jó	nagyon jó	kiváló	kiváló	kiváló
JAVASOLT VETÉSIDŐ	Az LG szemes kukorica hibridek vetését a termőhelyre jellemző optimális időben javasoljuk. Talajhőmérséklet min. 10°C						
Korai vetés	alkalmas	alkalmas	alkalmas	alkalmas	alkalmas	alkalmas	kifejezetten alkalmas
Késői vetés	alkalmas	-	alkalmas	-	-	-	-
JAVASOLT TŐSZÁM	ezer termőtő/ha						
Jó adottságú termőhelyen	75 - 80	75 - 80	72 - 75	72 - 75	72 - 75	72 - 75	75 - 78
Átlagos adottságú helyen	72 - 75	72 - 75	68 - 72	68 - 72	68 - 72	68 - 72	72 - 75
Gyengébb termőhelyen	68 - 72	68 - 72	65 - 68	-	65 - 68	65 - 68	68 - 72

	LG 30.389	LG 31.390	LG 31.401	LG 31.415	LG 31.455	LG 30.500
HIBRID JELLEMZŐK		ÚJ!		ÚJ!	ÚJ!	
Kezdeti fejlődési erély	jó	nagyon jó	jó	nagyon jó	átlagos	nagyon jó
Virágzási idő az éréscsoporton belül	átlagos	átlagos	közép-késői	átlagos	átlagos	közép-késői
Érésidő	korai	közép-korai	közép-korai	középérésű	középérésű	középérésű
Vízleadás	nagyon gyors	gyors	átlagos	gyors	átlagos	lassú
FAO szám	380-390	380-390	390-410	420-430	450-460	480-490
Termőképesség az éréscsoportjában	nagyon jó	kiváló	nagyon jó	kiváló	kiváló	nagyon jó
Termés stabilitás	jó	kiváló	jó	jó	jó	átlagos
Cső hosszúság / átmérő	hosszú/ közepes	közepes/ vastag	közepes/ vastag	hosszú/ vastag	hosszú/ vastag	közepes/ vastag
Szemsorok száma	14 - 16	18	18	16 - 18	16 - 18	18
Hektoliter tömeg	jó	átlagos	jó	nagyon jó	átlagos	átlagos
Szárazság tűrés	átlagos	jó	átlagos	nagyon jó	jó	nagyon jó
HYDRANEO	-	igen	-	igen	igen	igen
Cső egészség	nagyon jó	kiváló	kiváló	nagyon jó	kiváló	kiváló
Szár szilárdság	jó	nagyon jó	kiváló	nagyon jó	nagyon jó	kiváló
JAVASOLT VETÉSIDŐ	Az LG szemes kukorica hibridek vetését a termőhelyre jellemző optimális időben javasoljuk. Talajhőmérséklet min. 10°C					
Korai vetés	kifejezetten alkalmas	alkalmas	alkalmas	alkalmas	alkalmas	kifejezetten alkalmas
Késői vetés	nem javasoljuk	-	-	-	-	nem javasoljuk
JAVASOLT TŐSZÁM	ezer termőtő/ha					
Jó adottságú termőhelyen	70 - 75	72 - 75	70 - 75	68 - 72	68 - 72	68 - 70
Átlagos adottságú helyen	65 - 70	68 - 72	65 - 70	63 - 68	63 - 68	63 - 68
Gyengébb termőhelyen	nem ajánljuk	-	nem ajánljuk	-	-	55 - 63

 SILÓ KUKORICA ÖSSZEFOGLALÓ

	LG 31.383	SHANNON	LG 31.479	LG 34.90	AAPOTHEOZ	LG 31.558
HIBRID JELLEMZŐK	 					
Kezdeti fejlődési erély	átlagos	átlagos	átlagos	nagyon jó	kiváló	jó
Virágzási idő az éréscsoporton belül	korai	átlagos	közép-késői	átlagos	átlagos	korai
Növény magasság	közepes	közepes	közepes	magas	magas	magas
FAO szám	380-390	450-460	460-480	480-490	520-530	550-560
Zöldtermés	nagyon jó	jó	nagyon jó	nagyon jó	nagyon jó	kiváló
Termésszabítóság	jó	nagyon jó	nagyon jó	nagyon jó	nagyon jó	nagyon jó
Szárazságtűrés	jó	jó	nagyon jó	jó	jó	jó
Csőegészség	nagyon jó	jó	kiváló	nagyon jó	nagyon jó	nagyon jó
Szárszilárdság	jó	nagyon jó	nagyon jó	kiváló	kiváló	kiváló
EMÉSZTHETŐSÉGI ÉRTÉKEK	Optimális (32-35%) szárazanyag tartalomnál betakarítva					
Emészthető szervesanyag	jó	nagyon jó	kiváló	nagyon jó	kiváló	kiváló
Emészthető rostok aránya	nagyon jó	kiváló	nagyon jó	kiváló	nagyon jó	kiváló
Keményítő tartalom	jó	nagyon jó	nagyon jó	kiváló	nagyon jó	nagyon jó
JAVASOLT VETÉSIDŐ	Az LG siló kukoricahibridek vetését a termőhelyre jellemző optimális időben javasoljuk. Talajhőmérséklet minimum 10 C					
Korai vetés	alkalmas	alkalmas	alkalmas	alkalmas	alkalmas	alkalmas
Késői vetés	alkalmas	alkalmas				nem javasoljuk
JAVASOLT TŐSZÁM	ezer termőtő / ha					
Jó adottságú termőhelyen	75-78	72-75	72-75	72-75	72-75	72-75
Átlagos adottságú termőhelyen	72-75	68-72	68-72	68-72	68-72	68-72
Gyengébb termőhelyen	65-68	65-68	65-68	65-68	65-68	65-68

NAPRAFORGÓ ÖSSZEFOGLALÓ

	LG 50.479 SX	LG 50.779 HO SX	LG 54.92 HO CL	LG 50.797 HO CLP	LG 50.635 CLP	LG 54.78
HIBRID JELLEMZŐK	 linolsavas (LO)	 magas olajsavas (HO)	magas olajsavas (HO)	magas olajsavas (HO)	linolsavas (LO)	linolsavas (LO)
Kezdeti fejlődési erély	nagyon jó	jó	nagyon jó	átlagos	jó	nagyon jó
Virágzás kezdete	korai	közép-korai	közép-korai	közép-korai	közép-korai	korai
Növény magasság	középmagas	középmagas/ magas	középmagas	magas	középmagas	magas
Tányér állás	félíg bókóló	félíg bókóló	félíg bókóló	félíg bókóló	félíg bókóló	félíg bókóló
Érésidő	közép-korai	közép-korai	közép-korai	középérésű	középérésű	korai
Alkalmazkodó-képesség	nagyon jó	jó	nagyon jó	kiváló	nagyon jó	nagyon jó
Termőképesség	kiváló	nagyon jó	jó	jó	jó	nagyon jó
Olajtartalom	48-50%	47-49%	47-49%	48-50%	47-49%	47-49%
Olajsav tartalom	-	87-89%	87-89%	85-89%	-	-
BETEGSÉG ELLENÁLLÓSÁG						
Peronoszpóra rezisztencia a felsorolt patotípusokkal szemben	100; 330; 700; 704; 710; 714; 730	100; 330; 700; 704; 710; 714; 730	100; 330; 700; 704; 710; 714; 730	100; 330; 700; 704; 710; 714; 730	100; 330; 700; 710; 730	100; 330; 700; 704; 710; 714; 730
Fóma	jó	jó	nagyon jó	jó	nagyon jó	nagyon jó
Szklerotínia szártő / tányér	jó/jó	nagyon jó/átlagos	jó/átlagos	nagyon jó/átlagos	jó/átlagos	jó/jó
Makrofomina	nagyon jó	nagyon jó	kiváló	nagyon jó	kiváló	kiváló
Phomopsis	kiváló	jó	kiváló	átlagos	nagyon jó	kiváló
Alternaria	nagyon jó	jó	jó	jó	kiváló	nagyon jó
Szádor rezisztencia	A-E és G rassz	A-E és G rassz	A-E és G rassz	A-E és G rassz	A-E és G rassz	A-E és G rassz
JAVASOLT VETÉSIDŐ	Az LG napraforgó hibridek vetését a termőhelyre jellemző optimális időben javasoljuk.					
Korai vetés	-	alkalmas	-	alkalmas	nem javasoljuk	-
Késői vetés	-	-	alkalmas	-	-	alkalmas
JAVASOLT TŐSZÁM ezer termőtő/ha	57-60	58-60	55-58	55-58	55-60	55-60
GYOMIRTÁSI TECHNOLÓGIA						hagyományos



ŐSZI KÁPOSZTAREPCE VETŐMAG KÍNÁLATUNK



LG AMBASSADOR

- középérésű
- kipergés ellenálló
- Fómarezisztens (Rml7)
- TuYV rezisztens

LG ARCHITECT

- középérésű
- kipergés ellenálló
- Fóma toleráns
- TuYV rezisztens

LG ABSOLUT

- koraiérésű
- kipergés ellenálló
- Fómarezisztens (Rml7)
- TuYV rezisztens

ARSENAL

- koraiérésű
- kipergés ellenálló
- Fómarezisztens (Rml7)

LG CONRAD CL

- közép-korai
- kipergés ellenálló
- Fóma toleráns
- Clearfiled

LG CONSTRUCTOR CL

- középérésű
- kipergés ellenálló
- Fóma toleráns
- TuYV rezisztens
- Clearfiled

LG ALASCO

- Középérésű
- kipergés ellenálló
- Gyökérgolyva rezisztens

ARABELLA

- Középérésű
- fajta repce
- Fómarezisztens (Rml7)



KALÁSZOS VETŐMAG KÍNÁLATUNK

KALÁSZOS VETŐMAGJAINK VISZONTELADÓINKON KERESZTÜL ÉRHETŐK EL



ALCANTARA

- koraiérésű
- malmi búza
- Kalász típus: szálkás

ALTIGO

- koraiérésű
- malmi búza
- Kalász típus: szálkás

AVENUE

- koraiérésű
- malmi búza
- Kalász típus: tar

LG APILCO

- koraiérésű
- malmi búza
- Kalász típus: tar

LG ASCONA

- koraiérésű
- malmi búza
- Kalász típus: szálkás

AIRBUS

- közép-korai
- malmi búza
- Kalász típus: szálkás

LG ARMSTRONG

- közép-korai
- malmi búza
- Kalász típus: szálkás

LG ABSALON

- középérésű
- malmi búza
- Kalász típus: tar

EVINA

- középkésői
- malmi búza
- Kalász típus: tar



LG ZEBRA

- koraiérésű
- takarmány árpa
- Kalász típus: 6 soros

LG CAPRICORN

- középérésű
- takarmány árpa
- Kalász típus: 2 soros

LG TRIUMPH

- középérésű
- takarmány árpa
- Kalász típus: 6 soros





KERESSE TERÜLETI KÉPVISELŐINKET ELÉRHETŐSÉGEIKEN:



Bódis Zoltán

Regionális Értékesítési Vezető

Tel: +36-30-683-29-91 zoltan.bodis@limagrain.com



Ofenbeck János

Tel: +36-30-681-77-98

Győr-Moson-Sopron

janos.ofenbeck@limagrain.com



Varga László

Tel: +36-30-154-73-67

Vas és Észak-Zala

laszlo.varga@limagrain.com



Nemes Krisztián

Tel: +36-30-454-99-24

Dél-Zala és Nyugat-Somogy

krisztian.nemes@limagrain.com



Szabó Balázs

Tel: +36-30-407-48-81

Kelet-Somogy

balazs.szabo@limagrain.com



Vogl Attila

Tel: +36-70-453-77-63

Baranya

attila.vogl@limagrain.com



Szabó Tamás

Tel: +36-30-380-85-50

Tolna

tamas.szabo@limagrain.com



Gergely Róbert

Tel: +36-30-160-94-71

Fejér és Nyugat-Pest

robert.gergely@limagrain.com



Vida Ákos

Tel: +36-70-516-55-92

Veszprém és Komárom

akos.vida@limagrain.com



Kaszás János

Tel: +36-30-486-67-19

Kelet-Pest

janos.kaszas@limagrain.com



Görcs Ferenc

Tel: +36-30-768-45-74

Bács-Kiskun

ferenc.gorcs@limagrain.com



Dezső Tibor

Tel: +36-30-811-62-42

Békés és Dél-Csongrád-Csanád

tibor.dezso@limagrain.com



Kátai Gergely

Tel: +36-30-539-3086

Jász-Nagykun-Szolnok, É.-Csongrád-Csanád

gergely.katai@limagrain.com



Barócsi-Sári Hajnalka

Tel: +36-30-955-77-98

Heves, Nógrád és Jászság

hajnalka.barocsi-sari@limagrain.com



Poczkodi József

Tel: +36-30-913-83-08

Borsod-Abaúj-Zemplén

jozsef.poczkodi@limagrain.com



Dobi Mihály

Tel: +36-20-455-10-64

Hajdú-Bihar

mihaly.dobi@limagrain.com



Eszterhai Zoltán

Tel: +36-30-746-97-91

Szabolcs-Szatmár-Bereg, Kelet-Borsod

zoltan.eszterhai@limagrain.com



Lacfi Endre

Tel: +36-30-708-25-78

Országos Szaktanácsadó

lacfi@upcmail.hu



ERŐSEBB GYÖKÉRZET HATÉKONYABB TÁPANYAGFELVÉTEL

starcover

- Fokozza a gyökérzet aktivitását, segíti a tápanyagok gyorsabb felvételét.
- Erőteljesebb kezdeti gyökérfejlődést biztosít.
- Hozzájárul a homogén növényállomány kialakulásához.
- Segíti a korai stresszhatások könnyebb átvészelését.

TARTALOM

20 év	2-3
FRISS FUVALLAT	4-5
SZEMES KUKORICA	
LG 31.330 „Dorado”	6-7
LG 31.390 „Phalanx”	8-9
LG 31.415 Invador	10-11
LG 31.455 Lineade	12-13
LG 31.322 / LG 31.377	14
LG 31.388 / LG 30.500	15
LG 32.58 / LG 30.315	16
LG 30.369 Limanova / LG 30.389	17
SILÓKUKORICA	18
LG 31.558	19
SHANNON / LG 31.479	20
LG 34.90 / AAPOTHEOZ	21
NAPRAFORGÓ	22
LG 50.479 SX	23
LG 50.779 HO SX	24
Express® technológia	25
LG 50.797 HO CLP / LG 50. 635 CLP	26
Clearfield® és Clearfield® Plus technológia	27
LG 54.92 HO CL / LG 54.78	28
Genetikai védelem a termésbiztonságért	29
SZEMES KUKORICA ÁTTEKINTÉS	30-31
SILÓKUKORICA ÁTTEKINTÉS	32
NAPRAFORGÓ ÁTTEKINTÉS	33
ŐSZI KÁPOSZTAREPCE	34
ŐSZI BÚZA KÍNÁLAT	35
ŐSZI ÁRPA KÍNÁLAT	35
ELÉRHETŐSÉGEK	36-37
Starcover	38
Tartalom	39



Központi iroda:

Limagrain Central Europe SE Magyarországi Fióktelepe,

2040 Budaörs, Gyár u 2., Tel: 23-421-005 E-mail: limagrain-budaors@limagrain.com

LG vetőmagok

www.lgseeds.hu

